

CONNOCHAETES TAURINUS *BABAULTI*,  
FORME NOUVELLE DU BRITISH EAST AFRICA,

PAR M. MAX KOLLMANN.

Dans une note antérieure<sup>(1)</sup>, nous avons dressé la liste des espèces de Mammifères rapportées par M. Babault d'un voyage en Afrique orientale. De nouvelles peaux nous ayant été communiquées récemment, nous y avons trouvé un spécimen de Gnou qui, tout en se rapportant à l'espèce bien connue *Connochaetes taurinus* Burchell, mérite cependant d'être distingué et décrit comme le type d'une forme nouvelle.

Le dessus de la tête, depuis la base des cornes jusqu'au chevron frontal, est brun-brunâtre, un peu plus clair en avant; les faces latérales sont grises; une tache allongée, brun clair, entoure l'œil et se prolonge en avant jusqu'à la moitié de la longueur du chevron. Ce dernier est formé de longs poils abondants, très serrés, d'un noir pur. Les oreilles sont blanches en dedans, noires en dehors, sauf sur les bords; la marge blanche externe est particulièrement large, se prolonge jusqu'à la base et déborde tout autour de l'insertion du pavillon.

L'ensemble du cou, du tronc, la face externe des membres sont d'un brun enfumé, qui rappelle la teinte générale de *C. taurinus* type, mais diffère sensiblement de celle de *C. t. albojubatus*, forme qui est répandue dans la même région que notre *C. t. Babaulti*, et probablement côte à côte. Sur la ligne médiane dorsale, et en arrière sur la totalité de la croupe, la couleur s'éclaircit et passe à un blanc enfumé, très sale, à reflets jaunâtres.

Sur le cou sont à peine indiquées, et sur quelques centimètres seulement, quelques lignes transversales un peu plus foncées que le reste du poil. Il y a loin de cette disposition rudimentaire à l'ensemble de lignes noires si bien marquées sur le cou et les épaules de *C. t. albojubatus*.

La crinière commence immédiatement en arrière des cornes et se prolonge jusqu'au delà du garrot. Elle est relativement très courte; les poils qui la constituent ont au plus 17 à 18 centimètres de long; ils sont noirs et parfois terminés de blanc enfumé sur 5 à 6 centimètres.

Les longs poils qui pendent de la gorge et du cou forment une sorte de barbe très fournie, surtout en avant. Les poils de cette barbe ont au moins

(1) *Bull. du Muséum*, vol. XX, p. 319, 1914.

17 à 18 centimètres de long; ils sont noirs dans leur plus grande partie avec 6 ou 7 derniers centimètres brun clair.

Les membres sont teintés comme les flancs et la région antérieure du dos.

La queue est assez courte et terminée par un long pinceau de poils noirs.

Dimensions (♂ adulte, peau plate) :

Longueur de l'extrémité du museau à la base de la queue.	1 <sup>m</sup> 75
Longueur de la queue (sans le pinceau terminal).....	0 35
Longueur du pinceau.....	0 20
Longueur des oreilles.....	0 24

Le crâne ne diffère essentiellement en rien de celui de *C. taurinus* type ou de celui de *C. t. albojubatus*.

Les cornes ne sont pas très volumineuses. Comme chez *C. taurinus*, en général, elles se dirigent d'abord en dehors et en bas, puis se recourbent en arrière et en dedans.

Dimensions (♂ adulte) :

Longueur basilaire du crâne.....	0 <sup>m</sup> 42
Longueur des cornes (en droite ligne).....	0 22
Longueur des cornes (le long de la génératrice interne).	0 43
Écartement des extrémités.....	0 38

*C. t. Babaulti* se distingue des formes déjà décrites de *C. taurinus* par le chevron frontal qui n'existe pas dans l'espèce type, qui est noir au lieu d'être blanc comme chez *C. t. Johnstoni*; il se distingue également par sa barbe noire de *C. t. Hecki* et *C. t. albojubatus*, chez qui elle est blanche. Enfin la crinière est particulièrement courte.

En résumé, chevron noir, barbe noire, teinte foncée de la robe, crinière courte, absence presque complète de lignes sombres sur le cou, tel est l'ensemble de caractères qui définit cette forme nouvelle.

Le seul individu qui jusqu'ici la représente a été tué par M. Babault, dans la région de Narrosurra River (British East-Africa).